

VRAGEN?



Heb je een vraag over 3-MMC of andere middelen?
Neem dan contact met ons op!

INSTAGRAM: @_1NUL1

FACEBOOK: @1NUL1

TELEFOON: 0113 26 71 43

EMAIL: INFO@1NUL1.NL



WWW.1NUL1.NL

1NUL1 is powered by Emergis preventie

WAT IS DE WERKING

De werkingsduur van 3-MMC is tussen de 4 tot 7 uur. De effecten kunnen wat lijken op die van MDMA en cocaïne. 3-MMC werkt stimulerend en licht bewustzijnsveranderend.

Na gebruik van 3-MMC voelen gebruikers zich alert, energiek, meer empathisch en krijgen ze een gevoel van euforie. Ook wordt een stimulerend en soms erotiserend effect gemeld.

De effecten van 3-MMC zijn bij slikken voelbaar na 20 tot 60 minuten (afhankelijk van hoeveel je vooraf gegeten hebt). Bij snuiven voel je de werking al na een paar minuten. Nadat je de effecten begint te voelen, bereik je vrij snel je piek.

LAAT JE DRUGS TESTEN!

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico's.

Het is goed om jezelf te informeren over de werking en gezondheidsrisico's van een middel. Gelukkig is dat in Nederland mogelijk. Laat daarom altijd je drugs testen, zodat je weet wat en hoeveel ervan in zit!

Wanneer je drugs laat testen is dit altijd anoniem. Het enige wat de medewerkers willen weten is waar en wanneer je het middel hebt gekocht en wat je ervoor hebt betaald.

Op www.drugs-test.nl vind je meer info over drugstesten.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER

3-MMC



WWW.1NUL1.NL



3-MMC

3-MMC staat op lijst I van de Opiumwet. Dat betekent dat bezit, productie en verkoop verboden is. 3-MMC behoort tot de stofgroep synthetische cathinonen. Qua chemische structuur lijken cathinonen op amfetamines.

Sinds het verbod op 3-MMC zit er heel vaak wat anders in 3-MMC (vervuilingen). Bijvoorbeeld 3-CMC en 2-MMC. De sterkte van verschillende cathinonen lopen ook vaak heel erg uiteen. De effecten kunnen milder, maar ook heftiger zijn dan mensen gewend zijn van 3-MMC.

RISICO'S KORTE TERMIJN



3-MMC geeft een hevige kater; vermoeid gevoel door het niet slapen en onvoldoende of niet eten.



Ongewenste effecten zijn: slapeloosheid, agitatie, hallucinaties, hoofdpijn, een verhoogde bloeddruk, zeer snelle hartslag en hartkloppingen, spierspanning, verminderde eetlust, een verhoogde lichaamstemperatuur en de neiging tot bijnemen. Bij een aantal klachten is medisch ingrijpen nodig. Er zijn gevallen bekend met dodelijke afloop.



Het combineren van 3-MMC met andere stimulerende drugs zoals XTC of Amfetamine vergroot de kans op cardiovasculaire gezondheidsrisico's (zoals hart- en vaatproblemen) en klachten zoals agitatie en angst/paranoïa.



Door veel en vaak te gebruiken kan de gevoeligheid voor het ontwikkelen van een psychose toenemen.



Het gebruiken van deze drug vergoot de kans op een epileptische aanval als je daar gevoelig voor bent.

RISICO'S LANGE TERMIJN



3-MMC geeft een sterke craving. Er zijn aanwijzingen dat de kans op verslaving aan 3-MMC behoorlijk groot is.



Stimulerende middelen verhogen je lichaamsfuncties. Mensen met een hoge bloeddruk en/of hartproblemen wordt afgeraden te experimenteren met stimulerende middelen.



Er kunnen psychische klachten ontstaan of al aanwezige psychische klachten kunnen verergeren. Je somber of angstig voelen, niet lekker in je vel zitten en slechte concentratie.